Le cistiti ricorrenti nella donna

Daniele Grassi

Le cistiti ricorrenti nella donna

Congresso Regionale (Emilia Romagna) dell'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) - Associazione Ginecologi Territoriali (AGITE) - Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO), Simposio su "Il ginecologo e le sindromi dolorose mestruali", organizzato dalla Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna – Onlus, Modena, 29-31 marzo 2012

Le cistiti sono definite ricorrenti (Recurrent Urinary Tract Infections: R-UTI's) quando si verificano tre o più episodi in 12 mesi, o due episodi o più in 6 mesi. In età adulta, soffre di cistite una donna su tre. Le cistiti ricorrenti interessano il 25% delle donne che hanno avuto un primo episodio di cistite.

E' possibile che la progressione verso la cronicizzazione sia mediata dalla formazione intracellulare (dentro l'urotelio) di colonie di germi (Intracellular Bacterial Communities, IBC's), specie di Escherichia Coli, pronte a ri-virulentarsi per stimoli (noxae patogene) sempre più deboli.

Â© 2012 - Fondazione Alessandra Graziottin - www.fondazionegraziottin.org