## Quetiapine fumarate extended-release for the treatment of major depression with comorbid fibromyalgia syndrome: a double-blind, randomized, placebo-controlled study

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

H. San Raffaele Resnati, Milano

McIntyre A, Paisley D, Kouassi E, Gendron A.

Quetiapine fumarate extended-release for the treatment of major depression with comorbid fibromyalgia syndrome: a double-blind, randomized, placebo-controlled study Arthritis Rheumatol. 2014 Feb; 66 (2): 451-61. doi: 10.1002/art.38228

Valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità della **quetiapina fumarato a rilascio prolungato** nella cura della depressione maggiore e del dolore associati a fibromialgia: è questo l'obiettivo dello studio condotto da A. McIntyre e collaboratori del Regional Hospital di Penticton in British Columbia, Canada.

La quetiapina fumarato a rilascio prolungato ha già dimostrato la propria efficacia nel trattamento della depressione grave e del dolore ad essa associato. Il trial randomizzato, a doppio cieco e controllato contro placebo mira ad accertare se il farmaco – un neurolettico originariamente messo a punto per il trattamento sintomatico della schizofrenia – operi con pari efficacia quando il disturbo depressivo, come spesso accade, si manifesta in comorbilità con la fibromialgia.

La ricerca ha coinvolto, per un totale di 8 settimane, **120 pazienti** adulti affetti da depressione maggiore secondo i criteri diagnostici del "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition" (DSM-IV) e da fibromialgia secondo i criteri dell'American College of Rheumatology.

Due **le aree di risultato** da prendere in considerazione al termine della sperimentazione:

- il miglioramento medio dei sintomi depressivi registrato con l'Hamilton Depression Rating (HAM-D);
- il miglioramento dei sintomi depressivi misurati con altre scale di misurazione, del dolore, dei sintomi direttamente correlati alla fibromialgia, della qualità di vita e degli indici di funzionalità globale, nonché gli eventuali eventi avversi.

## Ecco i risultati:

- il miglioramento medio registrato con l'HAM-D è significativamente più elevato nel gruppo trattato con la quetiapina rispetto al gruppo placebo (-10.0 contro -5.8; P = 0.001);
- anche nella seconda area i miglioramenti registrati dal gruppo trattato con il farmaco rispetto al gruppo placebo sono, nella maggior parte dei casi, significativamente più consistenti;
- il farmaco risulta in generale ben tollerato.

McIntyre e collaboratori sono i primi a dimostrare l'efficacia della quetiapina fumarato a rilascio prolungato nella cura i sintomi depressivi e del dolore nei pazienti con depressione maggiore e fibromialgia. Sono ora necessarie ulteriori ricerche per confermare questi incoraggianti risultati e consolidare la pratica clinica.