

Mastociti, infiammazione e comorbidità nel dolore sessuale femminile: il punto di vista del gastroenterologo

V. Stanghellini

Mastociti, infiammazione e comorbidità nel dolore sessuale femminile: il punto di vista del gastroenterologo

Corso ECM su "Il dolore sessuale femminile: dai sintomi alla diagnosi e alla terapia" - Condirettrici: Prof.ssa Alessandra Graziottin e Dr. Filippo Murina - Organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna" e dalla Associazione Italiana Vulvodinia (AIV), Milano, 12 marzo 2010, Abstract book, p. 23

Il dolore ai quadranti inferiori dell'addome pone problematiche di non sempre facile soluzione in termini di diagnosi differenziale tra le varie patologie degli organi pelvici (principalmente apparato uro-genitale e tratto distale del canale alimentare).

La patologia digestiva più frequente caratterizzata da dolore addominale (spesso ai quadranti inferiori) è la sindrome dell'intestino irritabile (IBS). Studi epidemiologici condotti nei paesi occidentali su tale sindrome riportano un rapporto 'uomo: donna' di circa 1:2.

I meccanismi che legano stipsi, dolore pelvico e dispareunia/vaginismo sono sostanzialmente di due tipi.