Implicazioni ostetriche del dolore sessuale femminile: il punto di vista dell'ostetrica

M. Esposito

Implicazioni ostetriche del dolore sessuale femminile: il punto di vista dell'ostetrica
Corso ECM su "Il dolore sessuale femminile: dai sintomi alla diagnosi e alla terapia" - Condirettori: Prof.ssa Alessandra Graziottin e Dr. Filippo Murina - Organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna" e dalla Associazione Italiana Vulvodinia (AIV), Milano, 12 marzo 2010, Abstract book, p. 36-37

Circa il 10% delle donne riferisce dispareunia a 9-12 mesi dal parto. Solo il 15% delle donne con problemi sessuali ne parla con operatori sanitari: un miglior counselling a riguardo dovrebbe pertanto essere offerto alle donne sia in gravidanza sia dopo il parto.

Una valutazione sessuologica andrebbe effettuata non a 6 settimane dal parto, quando solo la metà delle donne ha ripreso l'attività sessuale, ma a 3 mesi dal parto, quando il 90% delle donne ha ricominciato ad avere rapporti sessuali con il partner.

I principali fattori di rischio per la comparsa di dispareunia dopo il parto, riportati in letteratura, sono l'allattamento al seno e il trauma perineale.

Â© 2010 - Fondazione Alessandra Graziottin - www.fondazionegraziottin.org