

Sexual and relationship satisfaction and vestibular pain sensitivity among women with provoked vestibulodynia

Prof.ssa Alessandra Graiottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

H. San Raffaele Resnati, Milano

Smith KB, Pukall CF, Chamberlain SM.

Sexual and relationship satisfaction and vestibular pain sensitivity among women with provoked vestibulodynia

J Sex Med. 2013 Aug; 10 (8): 2009-23. doi: 10.1111/jsm.12213. Epub 2013 Jun 19

La vestibolodinia provocata (in inglese: Provoked Vestibulodynia, PVD) – nuovo termine con cui si indica la vestibolite vulvare – è **una causa frequente di dolore ai rapporti**. Tuttavia, nonostante il fatto che la PVD sia associata ad alti livelli di dolore e ad un impatto negativo sulla sessualità femminile, non sono state sinora condotte ricerche approfondite sulla correlazione fra la sensibilità al dolore, da un lato, e la soddisfazione sessuale e relazionale, dall'altro.

Lo studio di K.B. Smith e collaboratori, del dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'Università della British Columbia a Vancouver, Canada, si propone di colmare questa lacuna, e studia:

- **la sensibilità al dolore vestibolare;**
- **la funzionalità e la soddisfazione sul piano sessuale e relazionale;**
- **le potenziali associazioni fra queste due variabili.**

Sono state studiate 17 donne con vestibolodinia provocata e 17 donne sane (controlli). L'analisi è stata condotta integrando **i seguenti strumenti**:

- visita ginecologica;
- intervista strutturata, con particolare riferimento al dolore percepito durante i rapporti;
- calcolo del Female Sexual Function Index (FSFI);
- compilazione del Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS);
- utilizzo della Dyadic Adjustment Scale (DAS).

Il Female Sexual Function Index (FSFI), strutturato in 19 domande, accerta le condizioni sessuali della donna in sei ambiti fondamentali – desiderio, eccitazione, lubrificazione, orgasmo, soddisfazione e dolore – e in totale. Il Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction è un questionario articolato in 28 punti per lo studio dei disturbi sessuali. La DAS scale, infine, è uno strumento per valutare la qualità della relazione.

Le partecipanti, inoltre, sono state sottoposte a un test sensoriale quantitativo volto a stimare la soglia del dolore vestibolare e l'intensità del dolore ad essa associato: in particolare, sono state valutate le soglie del dolore vestibolare alla pressione e al calore.

Questi, in sintesi, **i risultati**:

- le donne colpite da vestibolodinia provocata riportano un significativo impoverimento della funzione sessuale rispetto ai controlli, e in particolare una minore soddisfazione sul Female Sexual Function Index, mentre la qualità della relazione sessuale sembra non essere compromessa;
- queste donne segnalano inoltre un livello significativamente più alto di dolore vestibolare alla

visita ginecologica e nel corso delle procedure di valutazione della tolleranza al dolore da calore;
- esse, infine, manifestano una più bassa soglia del dolore da pressione e da calore, e una minore tolleranza al dolore da calore in corrispondenza del vestibolo, rispetto ai controlli;
- fra le donne con PVD, la minore soglia del dolore da calore si associa a una minore soddisfazione sessuale, mentre i più elevati livelli di dolore ai rapporti e la minore tolleranza al dolore da calore si associano, rispettivamente, a una minore funzionalità sessuale e a una minore soddisfazione.

I risultati sperimentali confermano dunque quanto già noto a un'attenta pratica clinica, e cioè che **le donne con vestibolidinia provocata sperimentano effetti negativi sulla sessualità e una maggiore sensibilità al dolore**, e che i minori livelli di funzionalità e soddisfazione sessuale possono essere correlati alla tipologia specifica del dolore (pressione, calore).