

Parto e dispareunia: uno studio prospettico

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

H. San Raffaele Resnati, Milano

McDonald EA, Gartland D, Small R, Brown SJ.

Dyspareunia and childbirth: a prospective cohort study

BJOG. 2015 Apr; 122 (5): 672-9. doi: 10.1111/1471-0528.13263. Epub 2015 Jan 21

Investigare la correlazione fra modalità del parto, trauma perineale e dispareunia: è questo l'obiettivo dello studio prospettico condotto da E.A. McDonald e collaboratori, dell'«Healthy Mothers Healthy Families Research Group» presso il Murdoch Childrens Research Institute di Melbourne, Australia.

La ricerca si è svolta in **sei ospedali ostetrici di Melbourne**, e ha coinvolto **1507 donne nullipare** reclutate nel primo e secondo trimestre di gravidanza. I dati sono stati raccolti per mezzo di un questionario somministrato **all'inizio dello studio e, successivamente, a 3, 6, 12 e 18 mesi dal parto**.

Questi, in sintesi, i risultati:

- 1244 donne (83%) hanno completato tutti i questionari;
- 1211 donne su 1237 (98%) hanno ripreso ad avere rapporti vaginali entro 18 mesi dal parto;
- **289 di esse (24%) provano dolore ai rapporti;**
- i dati corretti in base all'età materna e ad altri fattori potenzialmente confondenti indicano che, rispetto alle donne che hanno avuto un parto vaginale spontaneo senza traumi perineali o con abrasioni che non hanno richiesto sutura, sussiste un maggior rischio di dispareunia a 18 mesi dal parto per le donne che hanno avuto **un parto cesareo di emergenza** (aOR 2.41, 95% CI 1.4-4.0; P = 0.001), **un parto con ventosa ostetrica** (aOR 2.28, 95% CI 1.3-4.1; P = 0.005) e **un parto cesareo d'elezione** (aOR 1.71, 95% CI 0.9-3.2; P = 0.087).

A 18 anni dallo **storico studio di C.M. Glazener** (Sexual function after childbirth: women's experiences, persistent morbidity and lack of professional recognition, Br J Obstet Gynaecol. 1997 Mar; 104 (3):330-5), l'intervento ostetrico è dunque associato a una persistente dispareunia, il che conferma **l'insufficiente attenzione alla salute della donna al di fuori del periodo di cosiddetto "stato interessante"**. E' auspicabile, concludono gli Autori, che nel prossimo futuro:

- migliorino il riconoscimento e la comprensione del **ruolo delle diverse modalità di parto e dei traumi perineali** nella patogenesi di numerosi disturbi femminili;
- si mettano a punto **procedure atte a prevenire, quando possibile, la dispareunia post parto**.