

Dolore pelvico da endometriosi: efficacia terapeutica del dienogest

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

H. San Raffaele Resnati, Milano

Römer T.

Long-term treatment of endometriosis with dienogest: retrospective analysis of efficacy and safety in clinical practice

Arch Gynecol Obstet. 2018 Oct; 298 (4): 747-753. doi: 10.1007/s00404-018-4864-8. Epub 2018 Aug 3

Valutare l'efficacia del dienogest nella cura del dolore pelvico associato all'endometriosi: è questo l'obiettivo dello studio di Thomas Römer, del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia presso l'Università di Colonia, Germania.

L'endometriosi è una patologia che richiede una terapia di lungo termine. I progestinici come il **dienogest** sono utilizzati all'insorgere dei primi sintomi e dopo gli interventi chirurgici, per ridurre le recidive.

Questo studio retrospettivo ha analizzato l'efficacia e la sicurezza del dienogest in **37 donne** (età media: 39±8 anni), affette da un'endometriosi confermata da laparoscopia e curate per **60 mesi** con una dose giornaliera di **2 mg** in unica soluzione.

Il **dolore pelvico** è stato misurato su una scala analogica visuale da 0 a 100, alla baseline e ogni 12 mesi.

Questi, in sintesi, i risultati:

- **22 donne** hanno iniziato ad assumere il dienogest dopo un intervento chirurgico; il valore mediano del dolore era 70 prima dell'operazione, ed è sceso a 10, 10, 20, 20 e 20 rispettivamente dopo 12, 24, 36, 48 e 60 di trattamento;
- **15 donne** hanno iniziato la terapia senza essere state sottoposte a intervento chirurgico; il valore mediano del dolore era 80 alla baseline, ed è sceso a 20, 20, 30, 30 e 30 rispettivamente dopo 12, 24, 36, 48 e 60 mesi.

I **parametri di laboratorio**, misurati in un sottogruppo di 15 donne, sono rimasti nel range di normalità. Dopo 60 mesi, il livello medio di **estradiolo** era di 28±12 pg/ml. Sette donne hanno avuto episodi di **spotting**, e quattro hanno manifestato fasi di **depressione**, che è stata ben curata.

Lo studio conferma dunque che una terapia a base di 2 mg di dienogest al giorno per 60 mesi **riduce significativamente** il dolore pelvico associato all'endometriosi.