

## **Intestino irritabile con diarrea negli adulti: i farmaci approvati dalla Food and Drug Administration statunitense**

Prof.ssa Alessandra Graziottin  
Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica  
H. San Raffaele Resnati, Milano

Brenner DM, Sayuk GS.

### **Current US Food and Drug Administration-approved pharmacologic therapies for the treatment of irritable bowel syndrome with diarrhea**

Adv Ther. 2019 Nov 9. doi: 10.1007/s12325-019-01116-z. [Epub ahead of print]

Riepilogare le evidenze su tre farmaci attualmente raccomandati dalla statunitense Food and Drug Administration (FDA) per la cura della sindrome dell'intestino irritabile con diarrea (IBS-D) negli adulti: è questo l'obiettivo della review curata da Darren M. Brenner e Gregory S. Sayuk, rispettivamente della Feinberg School of Medicine presso la Northwestern University di Chicago, e della Washington University School of Medicine di Saint Louis, USA.

La sindrome dell'intestino irritabile è un disturbo caratterizzato da dolore addominale e alterazioni variabili dell'alvo: stipsi, diarrea, forme miste.

I farmaci approvati dalla FDA per il trattamento della forma di IBS associata a diarrea, negli adulti, includono:

- la **rifaximina**, antibiotico non assorbibile;
- l'**eluxadolina**, che agisce come agonista misto dei neurorecettori  $\mu$  e  $\kappa$ ; degli oppioidi, e antagonista del recettore oppiaceo  $\delta$ ;
- l'**aloseptron**, indicato solo nelle donne che non rispondono alle terapie convenzionali, che inibisce l'azione della serotonina a livello del sistema nervoso enterico, controllando il dolore intestinale e regolando il transito e le secrezioni gastrointestinali.

Questa la **posologia** dei tre farmaci:

- l'eluxadolina e l'aloseptron vengono somministrati come terapia giornaliera cronica;
- la rifaximina viene prescritta a cicli di due settimane, ripetibili al bisogno.

I **meccanismi d'azione** possono essere riepilogati in questi termini:

- la rifaximina modula il microbiota intestinale, riduce l'infiammazione, normalizza l'ipersensibilità viscerale e riduce la permeabilità intestinale;
- l'eluxadolina riduce la motilità gastrointestinale, la secrezione di fluidi e il dolore viscerale;
- l'aloseptron rallenta la motilità gastrointestinale.

L'efficacia e la sicurezza di questi farmaci sono state documentate da **rigorosi trial clinici**.