

## Menopausa: il fezolinetant riduce la frequenza e l'intensità dei sintomi vasomotori

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica  
H. San Raffaele Resnati, Milano

*Commento a:*

Bonga KN, Mishra A, Maiti R, Padhy BM, Meher BR, Srinivasan A.

**Efficacy and safety of fezolinetant for the treatment of menopause-associated vasomotor symptoms: a meta-analysis**

Obstet Gynecol. 2024 Mar 1;143(3):393-402. doi: 10.1097/AOG.0000000000005508. Epub 2024 Jan 16. PMID: 38227939

Valutare l'efficacia del fezolinetant nella cura dei sintomi vasomotori correlati alla menopausa: è questo l'obiettivo della review di Anand Srinivasan e collaboratori, del Dipartimento di Farmacologia presso lo All India Institute of Medical Sciences di Bhubaneswar, India.

Lo studio – condotto su PubMed-MedLine, ClinicalTrials.gov, EMBASE, Cochrane Database, Scopus e WHO International Clinical Trials Registry Platform – ha portato alla selezione di 5 trial randomizzati controllati contro placebo, per un totale di **2.168 pazienti**.

Il rischio di bias è stato verificato con il tool Cochrane's RoB 2 (Risk of Bias version 2), mentre la qualità delle evidenze è stata valutata con il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Questi, in sintesi, i principali risultati:

- il **fezolinetant** riduce significativamente la frequenza dei sintomi vasomotori da moderati a severi, con una differenza media ponderata di 2.62 (95% CI, 1.84-3.41);
- rispetto al placebo, il fezolinetant migliora anche la **qualità di vita complessiva** della donna in menopausa, misurata con l'indice MENQOL (Menopause-Specific Quality of Life) (-0.60; 95% CI, da -0.92 a -0.28);
- la percentuale media di miglioramento della **frequenza** dei sintomi vasomotori è 22.51% (95% CI, 15.35-29.67);
- la terapia con il fezolinetant, infine, correla con un netto miglioramento della **qualità del sonno**.