

## **Dolore cronico: uno studio americano analizza la diversa prevalenza fra uomini e donne**

Prof.ssa Alessandra Graziottin  
Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica  
H. San Raffaele Resnati, Milano

### *Commento a:*

Ricker A, Farley N, McClure JJ, Goudman L, Berwal D, Khazen O, Telkes I, Hani Abdullah UE, Wilson C, Pilitsis JG.

### **Chronic pain prevalence and severity in females before & after menopause versus males in a large multi-center database**

Pain Manag. 2025 Dec;15(12):915-920. doi: 10.1080/17581869.2025.2561399. Epub 2025 Sep 20. PMID: 40974255; PMCID: PMC12674445

Valutare la prevalenza e la gravità del dolore cronico nelle donne in pre- e post-menopausa in confronto agli uomini di pari età: è questo l'obiettivo dello studio osservazionale coordinato da Adam Ricker, dello Schmidt College of Medicine presso la Florida Atlantic University di Boca Raton (Stati Uniti).

Il **dolore cronico** è più frequentemente riportato dalle donne che dagli uomini e questo potrebbe essere influenzato dalla menopausa.

Lo studio è stato condotto su **53.289 partecipanti** estratte ed estratti dal database «All of Us Research» (National Institutes of Health, NIH). La gravità del dolore è stata misurata con una scala di valutazione numerica. Il campione è stato suddiviso in **quattro coorti** per età e sesso:

<li>donne di età compresa tra 18 e 50 anni (10.269);</li><li>donne di età pari o superiore a 51 anni (20.182);</li><li>uomini di età compresa tra 18 e 50 anni (4.989);</li><li>uomini di età pari o superiore a 51 anni (17.849).</li>Questi, in sintesi, i risultati:

<li>gli adulti più anziani riferivano livelli medi di dolore inferiori rispetto agli adulti più giovani, indipendentemente dal sesso ( $p < 0,001$ );</li><li>le donne anziane riferivano **livelli di dolore più elevati** rispetto agli uomini anziani ( $p < 0,001$ );</li><li>ciò potrebbe suggerire che le variazioni ormonali nelle donne possano influenzare i livelli di dolore;</li><li>queste tendenze sono risultate coerenti in tutte le coorti di individui (bianchi, neri e non ispanici);</li><li>è importante considerare il sesso e l'età nella gestione del dolore cronico;</li><li>i risultati hanno importanti implicazioni per la progettazione di **trattamenti terapeutici personalizzati**.</li>