Papillomavirus e cancro: tutti i possibili siti di attacco

Prof.ssa Alessandra Graziottin
Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica
H. San Raffaele Resnati, Milano

Sintesi del video e punti chiave

Di solito si crede che il papillomavirus attacchi colpisca solo l'area genitale: vulva, vagina collo dell'utero. In realtà, il virus può aggredire qualsiasi mucosa presente nell'organismo e quindi, in caso di rapporti non protetti, anche la bocca e l'ano. E' quindi indispensabile usare sempre il profilattico e, in caso di infezione, avvertire il medico curante su altri eventuali siti a rischio.

In questo video, la professoressa Graziottin illustra:

- i ceppi del papillomavirus più pericolosi dal punto di vista oncologico;
- perché, a volte, il medico non si informa sulla salute sessuale della donna, e la donna non ne parla di propria iniziativa;
- me una lesione precancerosa a livello del collo dell'utero possa accompagnarsi ad analoghe lesioni in bocca o nell'ano;
- perché queste lesioni sono più difficili da diagnosticare di quelle vulvari o vaginali;
- come comportarsi con il proprio medico in caso di lesioni precoci individuate a livello genitale;
- il ruolo del proctologo e dello stomatologo nel mettere a punto terapie tempestive ed efficaci;
- l'importanza di usare sempre il profilattico, in ogni tipo di rapporto e sin dall'inizio del rapporto.

Realizzazione tecnica di **Monica Sansone**

© 2021 - Fondazione Alessandra Graziottin - www.fondazionegraziottin.org