

Endometriosi, come curarla quando non si tollera il lattosio

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, H. San Raffaele Resnati, Milano

Dott.ssa Dania Gambini

Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, H. San Raffaele, Milano

"Mi chiamo Lucia, ho 41 anni e l'anno scorso sono stata operata per endometriosi al secondo stadio presso un centro specializzato, dopo un calvario e dolori lancinanti durati anni... e nessuno che mi sapesse indirizzare o dare una giusta diagnosi. Addirittura una volta, una delle tante, che sono andata al Pronto Soccorso per dolori acutissimi e iperventilazione, la dottoressa di turno, anziché curami, voleva mandarmi in psichiatria! Comunque, dopo l'intervento sono stata messa in terapia con la pillola contraccettiva, ma prima di questo ho dovuto prendere per tre mesi un prodotto a base di dienogest. Con questo farmaco sono subito stata male: al secondo e terzo mese avevo tutti, ma proprio tutti, i sintomi degli effetti collaterali della medicina. Ho iniziato ad avere problemi di intestino e diarrea. La cosa è continuata mesi e alla fine mi hanno trovato un'intolleranza al lattosio. E' un grosso problema, perché il lattosio è praticamente dappertutto. La mia domanda è: può quel prodotto a base di dienogest dare intolleranza al lattosio? E in caso affermativo, come faccio a guarire? Grazie".

Lucia

Gentile amica, l'intolleranza al lattosio (ossia l'incapacità di digerire lo zucchero del latte) è legata alla mancanza o a una diminuzione dell'enzima adibito alla sua digestione, ovvero la lattasi.

Può essere primaria (legata alla mancanza del gene che codifica per l'enzima, e quindi già presente fin dall'infanzia), o secondaria e transitoria (dovuta alla riduzione progressiva della digestione del lattosio e/o alla ridotta produzione di lattasi, ad esempio per mutate abitudini alimentari o a seguito di infezioni del tratto gastroenterico).

Non riteniamo che l'assunzione del prodotto a base di dienogest possa aver causato l'intolleranza al lattosio, ma che eventualmente possa aver contribuito a portare alla luce un problema già in corso.

Le consigliamo di controllare l'endometriosi ricorrendo a preparati estroprogestinici per via transdermica (cerotti), così da eludere il problema dell'intolleranza al lattosio. Un cordiale saluto.