

Pillola contraccettiva e ipertricosi: correlazioni

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, H. San Raffaele Resnati, Milano

Dott.ssa Dania Gambini

Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, H. San Raffaele, Milano

"Ho un ovaio di aspetto multifollicolare ed erroneamente mi è stata prescritta una pillola contenente gestodene. Dico erroneamente perché, dopo un anno di assunzione, ho riscontrato un aumento di peluria su tutto il corpo. Mi sono dunque rivolta a un altro ginecologo, il quale mi ha detto che il gestodene ha effetti androgenizzanti e che questa peluria andrà via appena finiranno gli effetti della pillola, che ovviamente ho sospeso. Mi chiedo però se davvero questa peluria andrà via spontaneamente. Cosa posso fare per risolvere questo inestetismo che mi sta causando molto imbarazzo? Mi sono stati prescritti dei dosaggi ormonali. Posso già farli al secondo ciclo dopo la sospensione della pillola o devo aspettare? Il primo ciclo dopo la sospensione è arrivato regolarmente. Grazie in anticipo per la risposta".

Gentile amica, il gestodene è un progestinico di terza generazione che non presenta attività androgenica a differenza di altri composti (ad esempio il levonogestrel). Pertanto le consigliamo di approfondire la comparsa della peluria mediante i dosaggi ormonali completi del profilo androgenico (testosterone totale e libero, androstenedione, DHEA, DHEAS): può effettuare il prelievo il terzo-quarto giorno del ciclo, anche al secondo ciclo spontaneo dopo la sospensione della pillola. In base ai risultati di tali esami si opterà per l'opzione terapeutica migliore e specifica per lei. Un cordiale saluto.