Fibromi, come preparare l'asportazione

Prof.ssa Alessandra Graziottin
Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, H. San Raffaele Resnati, Milano
Dott.ssa Dania Gambini
Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, H. San Raffaele, Milano

"Ho 44 anni e tre miomi sottomucosi, che sono in attesa di togliere con isteroscopia operativa. Visti i tempi di attesa per l'intervento il mio ginecologo mi ha prescritto una terapia a base di noretisterone acetato dal 5° al 26° giorno del ciclo. Ho già fatto due mesi di cura e ieri mi è arrivato il ciclo da sospensione del farmaco. Come già durante la prima sospensione, anche questo secondo ciclo è emorragico. E' normale che il ciclo da sospensione sia emorragico nonostante la cura? Grazie".

Gentile amica, le mestruazioni abbondanti sono legate ai miomi sottomucosi da lei descritti e per i quali le è stata correttamente proposta l'isteroscopia operativa per la loro resezione. La terapia con il progesterone non è risolutiva, ma mira a ridurre l'entità del quadro emorragico in attesa dell'intervento. Un cordiale saluto.

© 2018 - Fondazione Alessandra Graziottin - www.fondazionegraziottin.org