

Perdite di sangue in menopausa: è importante verificarne le cause

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, H. San Raffaele Resnati, Milano

Dott.ssa Dania Gambini

Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, H. San Raffaele, Milano

"Ho 56 anni, sono in menopausa da sei anni e utilizzo una terapia ormonale sostitutiva a bassissimo dosaggio. Qualche volta ho delle perdite di sangue accompagnate da un indolenzimento alla parte bassa dell'addome: talvolta le perdite sono di un rosso vivo, altre volte sono scure con coaguli. E' una cosa normale? Grazie in anticipo".

Cinzia

Gentile Cinzia, le perdite ematiche atipiche in caso di terapia ormonale sostitutiva vanno sempre indagate. Le consigliamo innanzitutto di interrompere in via precauzionale la terapia ormonale sostitutiva, e di effettuare un'ecografia ginecologica transvaginale al fine di valutare lo spessore della rima endometriale e l'eventuale presenza di cisti ovariche. In caso di persistenza degli episodi, anche a fronte di un quadro ecografico negativo, le suggeriamo di sottoporsi a un'isteroscopia diagnostica con esame istologico. Eventualmente ci riscriva. Un cordiale saluto. Un cordiale saluto.