

Dolore intimo dopo un herpes: un'ipotesi diagnostica

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, H. San Raffaele Resnati, Milano

Dott.ssa Dania Gambini

Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, H. San Raffaele, Milano

"Ho 24 anni, e a seguito di un grave herpes genitale ho iniziato ad avere forti dolori in prossimità del perineo (la zona da cui si era sviluppata l'infezione) durante i rapporti e nei giorni immediatamente successivi, con screpolatura della pelle e talvolta perdite di sangue. Purtroppo, dopo due anni, non sono ancora riuscita a risolvere questo problema. Quale potrebbe essere la causa, e un possibile rimedio? Un sentito ringraziamento".

Gentile amica, sarebbe opportuno valutare in sede di visita ginecologica la presenza di una vestibolite vulvare, un'infiammazione cronica del vestibolo vaginale (all'introito della vagina) associata a un ipertono di grado variabile della muscolatura del pavimento pelvico, che si manifesta clinicamente con un tipico bruciore/dolore durante l'inizio della penetrazione.

Se questa ipotesi diagnostica fosse confermata, risulterebbe necessario instaurare una terapia specifica, basata sull'utilizzo di farmaci antimicotici, miorilassanti e antinfiammatori oltre a sedute di riabilitazione del pavimento pelvico.

In attesa di una visita specifica, le consigliamo di applicare in corrispondenza dell'introito vaginale una crema rigenerativa e rinforzante a base di acido ialuronico e vitamina E, e di assumere integratori a base di acido alfa-lipoico per il benessere delle terminazioni nervose. Un cordiale saluto.