

Sanguinamento uterino anomalo: è sempre necessario indagarne le cause

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

H. San Raffaele Resnati, Milano

La risposta in sintesi

Gentile amica, il sanguinamento uterino al di fuori dei giorni delle mestruazioni non va mai sottovalutato: le cause vanno sempre indagate con attenzione. La sua vicenda, inoltre, mi permette di formulare alcune osservazioni generali sull'intervento chirurgico che ha subito e sulle sue conseguenze per la salute.

In questo video illustro:

- come l'infezione che ha portato all'intervento sia stata probabilmente causata da clamidia o gonococco, due agenti patogeni che scatenano un quadro clinico noto come "malattia infiammatoria pelvica";
- in quale modo si contraggono, in genere, queste due patologie;
- che cosa fanno i germi una volta entrati nell'apparato genitale;
- come l'infezione possa provocare una salpingite, un'ovarite e, nei casi più gravi, una pelvi-peritonite;
- perché la condizione di menopausa iatrogena determinata dall'intervento chirurgico non può, per definizione, accompagnarsi a valori ormonali "nella norma";
- come le perdite di sangue possano essere ricondotte, nella maggior parte dei casi, a un'infezione dell'endometrio o a un'iperplasia delle cellule dell'endometrio stesso;
- la conseguente necessità di procedere a un'isteroscopia con biopsie multiple, così da pervenire a una corretta diagnosi differenziale.

Realizzazione tecnica di **Monica Sansone**