

Dolore intimo da terapie oncologiche: i benefici del gel con spermidina e acido ialuronico

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

H. San Raffaele Resnati, Milano

La domanda

Sto facendo una terapia con inibitori dell'aromatasi, per un tumore al seno. Sono in menopausa da cinque anni, e ho una secchezza tremenda che mi rende impossibile avere rapporti. Ma ho paura di qualsiasi farmaco! Il gel alla spermidina e acido ialuronico è sicuro? Può essere usato anche dalle donne che, come me, hanno avuto un cancro al seno?

I temi toccati

Che cosa sono gli inibitori dell'aromatasi, e perché tendono a determinare secchezza vaginale o a peggiorarla, se la donna era già in menopausa al momento dell'inizio della terapiaPerché il gel a base di spermidina e acido ialuronico può essere usato in assoluta serenità, come complemento alle terapie farmacologiche e fisiche delle cause primarie e secondarie del dolore intimoPerché è opportuno valutare anche il tono dei muscoli del pavimento pelvico e, in particolare, la presenza di un eventuale ipertonoIl ruolo della fisioterapia nell'eliminazione della componente biomeccanica del doloreLe specifiche funzioni ristrutturanti e manutentive del gel*Per gentile concessione di Italpress - Focus Salute*